



CENTRO VETERINARIO HOSPIVETSANTANA

La Dilatación-Torsión de Estómago

La Dilatación-Torsión de Estómago es una de las enfermedades más temidas por los propietarios de razas grandes, si no se trata a tiempo, puede causar la muerte del animal.

Algunas razas tienen mayor predisposición a padecer esta enfermedad, pero lo cierto es que todos los perros, sin excepción alguna, pueden verse afectados.

Razas más predispuestas: En general animales delgados de pecho profundo, tanto mestizos con estas características o razas como: Borxoi, Boxer, Ovejero Alemán, Dobermann, Setter Irlandés, Galgos, Gran Danés, Schnauzer Gigante, San Bernardo, Mastiff, Terranova, Airedale Terrier, etc. Este tipo de animales tienen el estómago más caído y con mayor laxitud de los ligamentos que lo sostienen a la cavidad abdominal.

Sucede con frecuencia que encuentran a la mañana animales muertos porque el proceso se dió de madrugada mientras todos duermen. La pregunta que seguramente se estarán haciendo es ¿cómo sucede esto? Veamos a modo de ejemplo: Tenemos un animal que viene de un paseo después de jugar mucho, excitado; come compulsivamente y luego toma agua en cantidad, el estómago se dilata en exceso y pierde capacidad de generar las contracciones normales que hacen al mezclado del alimento y vaciado hacia el intestino delgado; esto sigue con una tendencia marcada del animal a tragar aire lo que hace que se dilate aun más el estómago. Este proceso puede detenerse aquí si el animal recupera la capacidad de eructar y de movilizar el estómago, o bien éste puede seguir paralizado; en estas instancias el veterinario tiene la posibilidad de resolver el problema colocando una sonda gástrica y vaciando el estómago de aire y su contenido. Si el proceso continúa, lo que sucede es que el bazo (que está pegado al estómago) se congestiona, hace peso como un péndulo y el estómago gira en sí mismo. Es aquí donde se generan las principales complicaciones a causa de la congestión generalizada; si no se realiza la cirugía correspondiente a tiempo junto con una serie de procedimientos médicos dirigidos a resolver las complicaciones clínicas generales, indefectiblemente lleva al animal a la muerte.

Este proceso puede suceder en el lapso de 2 a 4 horas con un desenlace fatal.

SÍNTOMAS

Lo más importante es saber cuáles son los primeros síntomas para poder recurrir en forma urgente a nuestro veterinario de cabecera y/o a una clínica de urgencia.

- 1.- El animal camina nervioso mirando y rascando el piso babeando, tratando de vomitar infructuosamente y sin poder eructar.
- 2.- Lo notamos hinchado, golpeamos su abdomen con la palma de la mano inmediatamente por detrás de las costillas y escuchamos un sonido hueco como un tambor.

Bajo estas circunstancias acudir urgentemente al veterinario. En ningún caso recurrir a medicación casera o intentar producir el vómito y menos aún presionar el abdomen.

Los animales que hayan tenido algún episodio tanto de dilatación y/o dilatación torsión deben seguir las indicaciones de su médico veterinario en lo que respecta a la dieta y el manejo de la misma (horarios, volúmenes, etc.)

PREVENCIÓN

Lo más frecuente es que la torsión se produzca después de comer, lo que nos obliga a prestar especial atención a la comida en su calidad y cantidad como lo más importante a tener en cuenta como elemento preventivo, a saber:

- 1.- Evitar grandes volúmenes de comida.
- 2.- Alimentar dos veces por día; si no come una de las raciones NO duplicar la siguiente.
- 3.- No alimentar a un perro agitado por cualquier motivo.
- 4.- Evitar que tomen agua en exceso después de comer, sobre todo en invierno con el agua helada del exterior.
- 5.- Ayuno previo a animales que serán sometidos a estrés como viajes, servicios, paseos largos etc.
- 6.- No alimentar al animal a última hora de la noche.